

Brug af Ritalin hos børnehavebørn

Antallet af børn i børnehvealderen, der er i behandling med methylphenidat (f.eks. Ritalin®) er de sidste 10 år steget voldsomt, selvom medicinen ikke er godkendt til børn under 6 år. Noget tyder dog på, at udviklingen er ved at bremse op. I 2010 var antallet af børn under 6 år i behandling med methylphenidat nemlig lavere end i 2009.

Ritalin® og Motiron®, der indeholder methylphenidat, er to af de lægemidler, der kan dæmpe symptomerne, hvis man lider af ADHD. Disse lægemidler er ikke godkendt til behandling af børn under 6 år, fordi der mangler viden om de specielle forhold, der knytter sig til små børns brug af medicinen.


DAMP, ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse?

Tidligere talte man i Danmark om DAMP. DAMP er en nordisk betegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception. DAMP er nu i daglig tale afløst af den internationale betegnelse ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. I sundhedsvæsenet er det officielle navn for tilstanden hyperkinetisk forstyrrelse.

Der er derfor risiko for, at lægen ikke er opmærksom på, hvilke bivirkninger der skal holdes ekstra øje med. Alligevel er antallet af børn under 6 år, der tager medicin mod ADHD vokset markant de seneste 10 år (se figur 1).

I år 2001 var der cirka 60 børn mellem 0 og 5 år, der tog medicin mod ADHD. I 2010 var dette tal steget kraftigt til knap 300 børn. Det er en stigning på næsten 400 %. Det vil sige, at for hvert barn, der var i behandling i år 2001, er der i dag 4 børn i behandling. Ser man nærmere på tallene viser det sig, at langt de fleste af børnene mellem 0 og 5 år er 5 år, og dermed fylder 6 mindre end et år efter de starter på ADHD-medicinen.

Dog ser det ud som om den kraftige vækst er ved at stilne af. I 2010 var der nemlig færre børn i behandling end året før. Og der er grund til at være varsom med at starte behandling af de helt små børn. For på trods af at medicinen kun er godkendt til behandling i op til 1 år, går der rigtig lang tid før børnene slipper af med stofferne igen, for hvis behandlingsstrategien fortsætter som hidtil, vil næsten 7 ud af 10 af børnene stadig være i behandling, når de bliver teenagere.



Figur 1: Antallet af børn under 6 år i behandling med ADHD-medicin er steget voldsomt de seneste 10 år – fra 60 børn i år 2001 til 297 børn i år 2010. Omkring ¾ af børnene er 5 år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bine Kjøller Bjerregaard på bkb@dkma.dk eller telefon 4488 9104.