


Forbruget af antidepressiva har været stabilt under COVID-19

Antallet af brugere af antidepressive lægemidler har været stabilt i 2020 sammenlignet med de seneste fem år. Det stabile niveau forstærker i 2020 trods COVID-19 og deraf følgende foranstaltninger til at forhindre smittespredning. Antidepressiva bruges hovedsagligt til at behandle depression og angst, men forbruget af antidepressiva svarer ikke nødvendigvis til forekomsten af depression og angst i befolkningen.

Antallet af brugere er steget en smule hvert år siden 2017, *jf.* figur 1. Mellem 2019 og 2020 steg antallet af brugere fra ca. 420.000 til ca. 426.000 personer, svarende til 1,5 pct. Til sammenligning var stigningen 0,9 pct. fra 2018 til 2019.

Figur 1 Antallet af brugere af antidepressiva, 2011-2020




Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion (N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. For hvert år er antallet af unikke brugere opgjort, så en person indgår i opgørelsen, hvis de har indløst mindst én recept på antidepressiva i det pågældende år.

Kortvarig stigning i forbrug af antidepressiva efter udmelding om nedlukning

Antallet af danskere, der har indløst recept på antidepressiva, har i store træk været ensartet måned for måned igennem 2020, *jf.* figur 2. Forbruget af antidepressiva stiger dog kortvarigt i marts måned efter statsministerens udmelding om nedlukningen af Danmark. Det samme gør sig gældende for december, hvor Danmark blev lukket ned for 2. gang.

Figur 2 Antallet af brugere af antidepressiva pr. måned, 2018-2020




Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion (N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. For hvert år er antallet af unikke brugere opgjort, så en person indgår i opgørelsen, hvis de har indløst mindst én recept på antidepressiva i den pågældende måned.

Ingen aldersgruppe skiller sig ud i forhold til foregående år

På tværs af aldersgrupper er der heller ikke sket nogen væsentlig ændring i antallet af brugere af antidepressiva fra 2019 til 2020, *jf.* figur 3. Dette på trods af at forskellige aldersgrupper har været påvirket forskelligt af COVID-19, alt efter om de har højere risiko for et alvorligt COVID-19 forløb, har børn, er under uddannelse, med videre. Dog er der en mindre stigning blandt 18 til 25-årige fra 2018 til 2020.

Figur 3 Antal brugere af antidepressiva pr. 1.000 personer fordelt på aldersgrupper, 2018-2020



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen..

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion (N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. Antallet af brugere opgjort som personer med mindst én receptindløsning på antidepressiva i det pågældende år. Alder er opgjort på tidspunktet for første receptindløsning på antidepressiva det pågældende år.