


30. august 2021

Højt forbrug af det antipsykotiske middel quetiapin i lavdosis blandt ældre plejehjemsbeboere

Omkring 7 pct. af alle ældre plejehjemsbeboere (65+år) anvender det antipsykotiske lægemiddel quetiapin i lavdosis (styrke på ≤ 150 mg) 2019. Det gælder for kun 1 pct. af de ældre, der bor i eget hjem. Andelen af brugere på plejehjem er højere uanset alder, *jf.* Figur 1. Andelen har ligget stabilt siden 2014 (Data ej vist).

Figur 1 Andelen af brugere af lavdosis quetiapin på 65 år eller derover i 2019, fordelt på plejehjemsbeboer og borger i eget hjem



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til og med juli 2021), plejehjemsadresser, CPR-registeret (opdateret juli 2021) og Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (opdateret august 2019) Sundhedsdatastyrelsen.


Note: Quetiapin er afgrænset til ATC-koden N05AH04. I opgørelsen indgår kun brugere, som udelukkende har købt lavdosis quetiapin (styrke ≤ 150 mg). Hvis brugeren både har købt lav- og en højere dosis er denne ekskluderet. Dog kan nogle brugere godt tage mere end én tablet (af lav styrke) dagligt, og reelt være i behandling med en højere dagsdosis end 150 mg. Disse brugere vil indgå i opgørelsen. Alder er brugerens alder pr. 1. januar i opgørelsesåret. Plejehjemsbeboere er afgrænset til borgere, der pr. 1. januar i opgørelsesåret har adresse på et plejehjem og som er 65 år eller derover. Hvis brugeren er flyttet ind på plejehjem i løbet af opgørelsesåret vil denne bruger ikke tælle med. Pr. 1. jan 2019 er der registret 38.569 plejehjemsbeboere. Borger i eget hjem er afgrænset til borger på 65 år eller derover, der ikke har en plejehjemsadresse pr. 1. januar i opgørelsesåret. I 2019 er dette tal på 1.1 mio. borgere.

Knap to-tredjedele (64 pct.) af brugerne på plejehjem har demens. Det gælder for kun 11 pct. af de ældre, der bor i eget hjem.

Fald i forbrug af lavdosis quetiapin tabletter på plejehjem

Der er sket et fald i forbruget af lavdosis quetiapin tabletter blandt ældre (65+ år) plejehjemsbeboerne siden 2014. Det gælder både for plejehjemsbeboere med (-12 pct.) og uden demens (-9 pct.). Til sammenligning ses kun et fald blandt ældre borgere med demens, der bor i eget hjem (-10 pct.). Forbruget er dog fortsat højest blandt plejehjemsbeboerne i 2019, *jf.* Figur 2.

Figur 2 Udvikling i det gennemsnitlige forbrug af lavdosis quetiapin tabletter blandt ældre på 65 år eller derover fra 2014 til 2019, fordelt på plejehjemsbeboer og borger i eget hjem med og uden demens



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til og med juli 2021), plejehjemsadresser og CPR-registeret (opdateret august 2021) og Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (opdateret august 2019) Sundhedsdatastyrelsen.

Note: For afgræsning af lavdosis quetiapin, alder og plejehjemsbeboere se note til figur 1.

Der blev i 2016 iværksat et initiativ, der skulle nedbringe forbruget af antipsykotika blandt borgere med demens frem mod 2025, da antipsykotika som udgangspunkt ikke anbefales til disse borgere. Dette blev iværksat som led i en større demenshandlingsplan for at sikre en bedre behandling for borgere med demens¹.

Det har formentlig resulteret i faldet i forbrug af lavdosis quetiapin blandt ældre borgere med demens. Det kan tænkes, at der har været øget fokus på dette på plejehjem, da en stor del (44 pct.) af beboerne er demente². Der ses dog ingen ændring i andelen af brugere (både på plejehjem og i eget hjem) siden 2014.

¹ Sundhedsministeriet (2016). *Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025*.

² Sundhedsdatastyrelsen (2020). *Nøgletal på ældreområdet 2015-2018*