


Flere lever med diagnosen tyktarmskræft

Antallet af incidente (nye) tilfælde af tyktarmskræft var i 2020 1.591 hos kvinder og 1.597 hos mænd. Den aldersstandardiserede incidensrate for tyktarmskræft har dermed været faldende siden 2015 og var i 2020 på 44 tilfælde pr. 100.000 borgere, svarende til 41 pr. 100.000 kvinder og 47 pr. 100.000 mænd, *Jf.* Figur 1. Samtidig er incidensraten i 2020 også den laveste siden 2011, og er generelt lidt lavere for kvinder end mænd gennem hele perioden 2011-2020.

Figur 1 Nye kræfttilfælde (incidens) for tyktarmskræft fordelt på køn, 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Opgørelsen viser antal nye tilfælde af tyktarmskræft pr. 100.000 kvinder og pr. 100.000 mænd i aldersstandardiserede incidensrater. Opgørelsen bygger på indberettede diagnoser til Cancerregisteret, og dækker antal nye kræfttilfælde i året og IKKE antal personer, der har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange. Op mod 25 procent af indberetningerne er berørt af manuel validering. Desuden stammer op til 0,5 procent af tallene fra en samkørsel med Dødsårsagsregisteret, hvorved der identificeres personer med anmeldelsespligtige kræftformer, som ikke er anmeldt til Cancerregisteret.


Bemærk at COVID-19 kan have haft indflydelse på tal for 2020.

Der skal være opmærksomhed på, at der kan tilkomme flere nye kræfttilfælde ved senere opgørelse af 2020, samt at der er tilkommet flere nye kræfttilfælde for 2019 siden seneste årsrapport.

For begge køn ses en stort set identisk udvikling af både 1- og 5-årsoverlevelsen for tyktarmskræft, *Jf.* Figur 2. Af personer diagnosticeret med tyktarmskræft i perioden 2018-2020 var 86 pct. af både mænd og kvinder i live ét år efter diagnosen, mens dette kun var gældende for 78 pct. af de diagnosticerede i perioden 2009-2011.

Tilsvarende er også 5-årsoverlevelsen steget. For kvinder er 5-årsoverlevelsen steget fra 60 pct. af de diagnosticerede i 2009-2011 til 70 pct. af de diagnosticerede i 2018-2020. Hos mændene ses en lidt større stigning, nemlig fra 59 pct. til 72 pct., *Jf.* Figur 2.

Figur 2 1-års og 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter tyktarmskræft, 2009-2011 til 2018-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioder er årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

I perioder, hvor patienter ikke kan følges i fem år, hvilket gælder for perioderne 2015-2017 og 2018-2020, suppleres beregningerne med overlevelseserfaringer fra patienter der er diagnosticeret før periodestart. Læs mere om kræftoverlevelse, herunder metode og beregninger, i [Kræftoverlevelse 2006-2020](#).