

RAPPORT

2023

# Kræftoverlevelse i Danmark

Cancerregisteret

2007 - 2021



SUNDHEDSDATA-  
STYRELSEN

<b>Udgiver</b>	Sundhedsdatastyrelsen
<b>Copyright</b>	Sundhedsdatastyrelsen
<b>Version</b>	1.0
<b>Versionsdato</b>	3. maj 2023
<b>Web-adresse</b>	<a href="http://www.sundhedsdata.dk">www.sundhedsdata.dk</a>
<b>Titel</b>	Kræftoverlevelse i Danmark

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

# Indhold

Kræftoverlevelse i Danmark fra 2007 til 2021 .....	4
1-årsoverlevelse for alle kræftformer .....	5
5-årsoverlevelse for alle kræftformer .....	6
Udviklingen i overlevelsen for 15 udvalgte kræftformer .....	7
1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer .....	8
5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer .....	9
Bilagstabeller .....	11

# Kræftoverlevelse i Danmark fra 2007 til 2021

Denne rapport fokuserer på henholdsvis 1-års- og 5-årsoverlevelse for alle kræftformer samt udviklingen fordelt på 15 udvalgte kræftformer i perioden 2007-2021. Overlevelsen er beregnet som relativ overlevelse, *jf.* Tekstboks 1.

Prostatakræft og brystkræft udgør en stor del af den samlede kræftforekomst, og derfor påvirker særligt disse to kræftformer den samlede overlevelse (for begge i positiv retning), *jf.* Tekstboks 2 side 7. Derfor opgøres den samlede overlevelse både inklusiv og eksklusiv disse to kræftformer.

Foruden nærværende rapport præsenteres 3-års- og 10-årsoverlevelse, regionale fordelinger samt dokumentation af metoder på [esundhed.dk](https://www.esundhed.dk) - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata: <https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Kraeftoverlevelse>.

## Tekstboks 1: Relativ overlevelse

Overlevelsen måles som den aldersstandardiserede relative overlevelse henholdsvis et og fem år efter diagnose. Relativ overlevelse kan fortolkes som sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom, når der er justeret for andre dødsårsager. Den relative overlevelse beregnes som forholdet mellem den observerede overlevelse blandt personer med kræft og den forventede overlevelse blandt disse, såfremt de ikke havde den pågældende kræftdiagnose.


## 1-årsoverlevelse for alle kræftformer

For personer diagnosticeret i 2019-2021 var den samlede 1-årsoverlevelse for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft<sup>1</sup> end modermærkekræft) på 84 procent (pct.) for kvinder og 83 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1.

Ved yderligere eksklusion af prostata- og brystkræft var den samlede 1-årsoverlevelse for personer diagnosticeret i 2019-2021 på 80 pct. for kvinder og 78 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1.

I perioden fra 2007-2009 til 2019-2021 ses en stigning i 1-årsoverlevelsen efter kræft fra 76 pct. til 84 pct. for kvinder og fra 75 pct. til 83 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1. Sammenlignet med perioden 2016-2018 er 1-årsoverlevelsen for perioden 2019-2021 et procentpoint højere for både mænd og kvinder.

**Figur 1** 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakræft), 2007-2009 til 2019-2021



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022, Sundhedsdatastyrelsen.  
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS)


<sup>1</sup> Basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft medregnes ikke, da disse kræftformer sjældent er dødelige.

## 5-årsoverlevelse for alle kræftformer

I perioden 2019-2021 er den samlede 5-årsoverlevelse 70 pct. for kvinder og 67 pct. for mænd for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft), jf. Figur 2. Sammenlignet med perioden 2016-2018 er 5-årsoverlevelsen for perioden 2019-2021 et procentpoint højere for kvinder, mens den er uændret for mænd.

Når mænd med prostatakræft og kvinder med brystkræft ikke medregnes, ses i perioden 2019-2021 samme 5-årsoverlevelse for begge køn som i perioden 2016-2018 på henholdsvis 63 pct. for kvinder og 60 pct. for mænd.

**Figur 2** 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakræft), 2007-2009 til 2019-2021



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022, Sundhedsdatastyrelsen.  
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS)

## Udviklingen i overlevelsen for 15 udvalgte kræftformer

Den stigende tendens i 1- og 5-årsoverlevelsen for kvinder og mænd siden perioden 2007-2009 er gældende for de fleste af de udvalgte kræftformer, *jf.* Bilagstabel 1 og Bilagstabel 2. Dog har overlevelsen for prostata-, testikel- og modermærkekræft konstant ligget forholdsvis højt.

For begge køn ses den største stigning i både 1-års- og 5-årsoverlevelsen for lungekræft. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for lungekræft steget fra 40 pct. i 2007-2009 til 61 pct. i 2019-2021, mens den for mænd i samme periode er steget fra 34 pct. til 54 pct., *jf.* Bilagstabel 1. Stigningen i 5-årsoverlevelsen for lungekræft fra 2009-2011 til 2019-2021 er for kvinder på 16 procentpoint og for mænd på 14 procentpoint, *jf.* Bilagstabel 2. Den næsthøjeste stigning i 5-årsoverlevelsen ses for tyktarmskræft med en stigning fra 58 pct. i 2007-2009 til 73 pct. i 2019-2021 for kvinder og fra 58 pct. til 71 pct. for mænd i samme periode, *jf.* Bilagstabel 2.

I de kommende afsnit præsenteres udviklingen for henholdsvis 1-årsoverlevelsen og 5-årsoverlevelsen for de 15 udvalgte grupper siden forrige periode (2016-2018).

### Tekstboks 2: Diagnostisk aktivitet

I årene frem til 2009 blev den diagnostiske aktivitet for prostatakræft og brystkræft øget med henblik på tidlig opsporing og diagnose. Det indebar øget brug af PSA-måling<sup>2</sup> og udrulning af mammografi-screening til hele Danmark i 2007-2009. Disse tiltag kan være medvirkende til den forbedrede overlevelse, der er observeret i de efterfølgende år.

I foråret 2014 blev nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft implementeret, og overlevelsestallene for disse kræftsygdomme skal ses i lyset af dette.

Øget diagnostisk aktivitet kan påvirke overlevelsestallene på flere måder. Det kan føre til, at kræften opdages på et tidligere tidspunkt, og personer med kræft af den grund lever længere efter diagnostetidspunktet (lead time bias). Derudover kan man finde flere langsomt voksende kræftsvulster end tidligere, og derfor vil flere mindre aggressive kræfttilfælde med bedre prognose indgå i overlevelseregningerne (length time bias).

---

<sup>2</sup> prostata-specifikt-antigen (PSA) målt ved blodprøve.

## 1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

For mænd er 1-årsoverlevelsen for lungekræft fire procentpoint højere i 2019-2021 (54 pct.) sammenlignet med den foregående periode 2016-2018 (50 pct.), *jf.* Tabel 1. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for lungekræft 61 pct. i 2019-2021, hvilket er to procentpoint højere end i 2016-2018. For mænd er 1-årsoverlevelsen for hoved-halskræft på 85 pct. i 2019-2021 sammenlignet med 83 pct. i 2016-2018. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for livmoderhalskræft 89 pct. i 2019-2021, hvilket er to procentpoint lavere end i 2016-2018.

Tabel 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer, 2016-2018 til 2019-2021

	Kvinder		Mænd	
	2016-2018	2019-2021	2016-2018	2019-2021
Hoved-hals*	86 (84-88)	87 (86-89)	83 (81-84)	85 (83-86)
Tyktarm	86 (85-87)	86 (85-87)	86 (85-87)	86 (85-87)
Endetarm	91 (89-92)	90 (88-91)	90 (88-91)	89 (88-91)
Lunge	59 (58-61)	61 (60-63)	50 (49-52)	54 (52-55)
Modermærke	99 (99-100)	99 (99-100)	99 (98-99)	98 (97-98)
Bryst	97 (97-97)	97 (97-97)		
Livmoderhals	91 (88-92)	89 (87-91)		
Livmoder	93 (92-94)	93 (91-94)		
Æggestok	82 (80-84)	81 (79-83)		
Prostata			99 (98-99)	98 (98-99)
Testikel			97 (93-98)	99 (95-100)
Neoplasi i urinveje	87 (86-88)	88 (87-90)	90 (89-90)	91 (91-92)
Hjerne og centralnervesystem	91 (90-92)	92 (91-93)	86 (84-87)	86 (85-87)
Lymfatisk væv*	92 (91-93)	93 (92-94)	90 (89-91)	90 (89-91)
Bloddannende væv*	83 (81-85)	83 (81-85)	84 (82-85)	84 (83-86)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022, Sundhedsdatastyrelsen.  
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

\*For disse grupper blev der foretaget ændringer i de inkluderede diagnoser (Bilagstabel 3) til publikationen i 2019 og overlevelsen for grupperne kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.



## 5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

For kvinder er 5-årsoverlevelsen tre procentpoint lavere for endetarmskræft og livmoderhalskræft i 2019-2021 sammenlignet med 2016-2018, *jf.* Tabel 2. Derimod er 5-årsoverlevelsen for hjerne- og centralnervesystem for kvinder tre procentpoint højere i 2019-2021 sammenlignet med 2016-2018. For de øvrige kræftformer varierer 5-årsoverlevelsen for kvinder højest med et procentpoint mellem de to perioder. For mænd er 5-årsoverlevelsen for lungekræft 25 pct. i 2019-2021, mens den er 23 pct. for 2016-2018. De øvrige kræftformer varierer højest med et procentpoint mellem de to perioder for mænd.

Tabel 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer, 2016-2018 til 2019-2021

	Kvinder		Mænd	
	2016-2018	2019-2021	2016-2018	2019-2021
Hoved-hals*	72 (69-74)	72 (68-75)	64 (62-66)	65 (62-67)
Tyktarm	72 (70-73)	73 (71-74)	72 (70-73)	71 (69-73)
Endetarm	75 (72-77)	72 (69-75)	71 (68-73)	70 (67-73)
Lunge	31 (29-32)	31 (30-33)	23 (22-25)	25 (23-27)
Modermærke	98 (97-99)	97 (96-98)	95 (94-96)	95 (93-96)
Bryst	90 (89-90)	90 (89-91)		
Livmoderhals	79 (76-82)	76 (73-80)		
Livmoder	82 (80-84)	81 (79-83)		
Æggestok	46 (43-48)	45 (42-49)		
Prostata			89 (88-90)	88 (87-90)
Testikel			94 (89-97)	94 (87-98)
Neoplasi i urinveje	75 (73-77)	75 (72-77)	77 (76-79)	78 (76-79)
Hjerne og centralnervesystem	83 (82-85)	86 (84-87)	71 (69-73)	72 (70-74)
Lymfatisk væv*	84 (82-85)	84 (82-86)	79 (77-81)	78 (76-80)
Bloddannende væv*	66 (63-69)	66 (63-69)	64 (62-66)	64 (61-66)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022, Sundhedsdatastyrelsen.  
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

\*For disse grupper blev der foretaget ændringer i de inkluderede diagnoser (Bilagstabel 3) til publikationen i 2019 og overlevelsen for grupperne kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.

<b>Publikation:</b>	Publikationen "Kræftoverlevelsen i Danmark" fra Sundhedsdatastyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratører inden for stat, regioner, kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.
<b>Mere information:</b>	Se mere detaljerede tal samt metodebeskrivelse på <a href="https://www.esundhed.dk">esundhed.dk</a> - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata [ <a href="https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Kraeftoverlevelse">https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Kraeftoverlevelse</a> ]
<b>Kilde og beregninger:</b>	Alle beregninger er foretaget af Kræftens Bekæmpelse for Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af Cancerregisteret og CPR.
<b>Kontaktperson:</b>	Trine Brandt Toft Sørensen, tlf. 3268 8686, <a href="mailto:tbts@sundhedsdata.dk">tbts@sundhedsdata.dk</a> Christina Witt Bæksted, tlf. 3268 9065, <a href="mailto:chwb@sundhedsdata.dk">chwb@sundhedsdata.dk</a>

## Bilagstabeller

Bilagstabel 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer og alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakraft for mænd), 2007-2009 til 2019-2021.

	Kvinder					Mænd				
	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021
Hoved-hals	80 (78-82)	81 (79-83)	86 (84-88)	86 (84-88)	87 (86-89)	78 (76-80)	79 (77-81)	83 (81-84)	83 (81-84)	85 (83-86)
Tyktarm	77 (75-78)	80 (78-81)	86 (85-87)	86 (85-87)	86 (85-87)	77 (75-78)	79 (78-81)	85 (84-86)	86 (85-87)	86 (85-87)
Endetarm	83 (81-85)	85 (83-86)	90 (88-91)	91 (89-92)	90 (88-91)	84 (82-85)	84 (82-86)	89 (88-91)	90 (88-91)	89 (88-91)
Lunge	40 (39-41)	46 (45-48)	52 (51-54)	59 (58-61)	61 (60-63)	34 (33-36)	39 (37-40)	44 (43-45)	50 (49-52)	54 (52-55)
Modermærke	98 (97-98)	98 (98-99)	99 (98-99)	99 (99-100)	99 (99-100)	96 (95-97)	97 (96-98)	98 (97-99)	99 (98-99)	98 (97-98)
Bryst	96 (96-96)	97 (96-97)	97 (97-98)	97 (97-97)	97 (97-97)					
Livmoderhals	85 (82-87)	89 (86-91)	87 (84-89)	91 (88-92)	89 (87-91)					
Livmoder	91 (89-92)	94 (92-95)	94 (92-95)	93 (92-94)	93 (91-94)					
Æggestok	74 (71-76)	77 (75-79)	80 (78-82)	82 (80-84)	81 (79-83)					
Prostata						97 (97-98)	98 (98-98)	98 (97-98)	99 (98-99)	98 (98-99)
Testikel						96 (92-98)	98 (94-99)	98 (93-100)	97 (93-98)	99 (95-100)
Neoplasi i urinveje <sup>1)</sup>	78 (76-80)	82 (81-84)	85 (84-87)	87 (86-88)	88 (87-90)	85 (84-86)	87 (86-88)	89 (88-90)	90 (89-90)	91 (91-92)
Hjerne og centralnervesystem <sup>1)</sup>	84 (83-85)	88 (87-89)	90 (88-91)	91 (90-92)	92 (91-93)	77 (75-79)	81 (80-83)	84 (83-85)	86 (84-87)	86 (85-87)
Lymfatisk væv <sup>1)</sup>	86 (84-87)	89 (87-90)	92 (91-93)	92 (91-93)	93 (92-94)	84 (83-86)	85 (84-87)	88 (87-89)	90 (89-91)	90 (89-91)
Bloddannende væv <sup>1)</sup>	78 (76-80)	81 (79-83)	83 (81-85)	83 (81-85)	83 (81-85)	76 (74-78)	80 (78-82)	83 (81-84)	84 (82-85)	84 (83-86)
<b>Alle kræftformer<sup>2)</sup></b>	<b>76 (75-76)</b>	<b>79 (78-79)</b>	<b>82 (81-82)</b>	<b>83 (83-84)</b>	<b>84 (84-84)</b>	<b>75 (74-75)</b>	<b>77 (76-77)</b>	<b>80 (80-80)</b>	<b>82 (81-82)</b>	<b>83 (82-83)</b>
<b>Alle kræftformer<sup>3)</sup></b>	<b>68 (68-69)</b>	<b>72 (72-73)</b>	<b>77 (77-77)</b>	<b>79 (79-80)</b>	<b>80 (80-80)</b>	<b>67 (66-67)</b>	<b>70 (69-70)</b>	<b>75 (74-75)</b>	<b>77 (77-77)</b>	<b>78 (78-79)</b>

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022 og Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

1) Inkluderer også andet end invasiv cancer *jf.* Bilagstabel 3.

2) Alle kræftformer ekskl. basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft.

3) Alle kræftformer ekskl. prostatakraft (mænd) og brystkræft (kvinder) samt basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft.

Bilagstabel 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer og alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end moder-  
mærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd), 2007-2009 til 2019-2021

	Kvinder					Mænd				
	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2007-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021
Hoved-hals	63 (60-67)	65 (62-68)	71 (68-74)	72 (69-74)	72 (68-75)	56 (53-59)	58 (55-61)	62 (60-65)	64 (62-66)	65 (62-67)
Tyktarm	58 (56-60)	62 (60-64)	71 (69-72)	72 (70-73)	73 (71-74)	58 (56-60)	60 (58-62)	69 (68-71)	72 (70-73)	71 (69-73)
Endetarm	65 (62-67)	67 (64-69)	74 (72-77)	75 (72-77)	72 (69-75)	61 (58-63)	65 (63-68)	72 (70-74)	71 (68-73)	70 (67-73)
Lunge	15 (14-16)	19 (18-21)	24 (23-25)	31 (29-32)	31 (30-33)	11 (10-12)	13 (12-14)	18 (17-19)	23 (22-25)	25 (23-27)
Modermærke	93 (91-94)	94 (93-95)	96 (95-97)	98 (97-99)	97 (96-98)	88 (86-89)	91 (89-92)	94 (92-95)	95 (94-96)	95 (93-96)
Bryst	86 (85-87)	88 (87-89)	89 (88-89)	90 (89-90)	90 (89-91)					
Livmoderhals	68 (65-71)	71 (67-74)	71 (68-74)	79 (76-82)	76 (73-80)					
Livmoder	83 (81-85)	82 (80-84)	84 (82-86)	82 (80-84)	81 (79-83)					
Æggestok	40 (37-42)	41 (38-43)	44 (42-47)	46 (43-48)	45 (42-49)					
Prostata						86 (85-87)	88 (87-89)	89 (88-90)	89 (88-90)	88 (87-90)
Testikel						96 (89-98)	98 (86-100)	98 (87-100)	94 (89-97)	94 (87-98)
Neoplasi i urinveje <sup>1)</sup>	63 (60-65)	68 (66-70)	71 (69-73)	75 (73-77)	75 (72-77)	70 (69-72)	72 (70-73)	76 (75-77)	77 (76-79)	78 (76-79)
Hjerne og centralnervesystem <sup>1)</sup>	73 (71-74)	79 (77-80)	81 (79-82)	83 (82-85)	86 (84-87)	62 (60-65)	66 (63-68)	69 (67-71)	71 (69-73)	72 (70-74)
Lymfatisk væv <sup>1)</sup>	73 (71-75)	78 (76-79)	81 (80-83)	84 (82-85)	84 (82-86)	66 (64-68)	71 (69-73)	74 (72-75)	79 (77-81)	78 (76-80)
Bloddannende væv <sup>1)</sup>	61 (58-64)	63 (60-66)	66 (63-68)	66 (63-69)	66 (63-69)	57 (54-60)	59 (57-62)	65 (63-67)	64 (62-66)	64 (61-66)
<b>Alle kræftformer<sup>2)</sup></b>	<b>61 (60-61)</b>	<b>63 (63-64)</b>	<b>67 (66-67)</b>	<b>69 (69-70)</b>	<b>70 (69-70)</b>	<b>58 (58-59)</b>	<b>60 (60-61)</b>	<b>65 (64-65)</b>	<b>67 (66-67)</b>	<b>67 (66-67)</b>
<b>Alle kræftformer<sup>3)</sup></b>	<b>51 (50-52)</b>	<b>55 (54-55)</b>	<b>60 (59-60)</b>	<b>63 (62-63)</b>	<b>63 (63-64)</b>	<b>48 (47-48)</b>	<b>51 (51-52)</b>	<b>57 (56-58)</b>	<b>60 (59-60)</b>	<b>60 (59-61)</b>

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2022 og Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

1) Inkluderer også andet end invasiv cancer *jf.* Bilagstabel 3.

2) Alle kræftformer ekskl. basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft.

3) Alle kræftformer ekskl. prostatakræft (mænd) og brystkræft (kvinder) samt basocellulær- og anden hudkræft end modermærkekræft.

### Bilagstabel 3 ICD10 gruppering til grund for udvalgte grupper

Anvendt klassifikation	ICD-10
Hoved-hals	C00-14*, C30-32, C73
Tyktarm	C18-19
Endetarm	C20
Lunge	C33-34
Modermærke	C43
Bryst	C50
Livmoderhals	C53
Livmoder	C54-55
Æggestok	C56, C570-4
Prostata	C61
Testikel	C62
Neoplasi i urinveje	C64-68, D090-091, D095-096, D301-309, D411-419 Yderligere er D-koderne afgrænset ved morfologierne 812-813.
Hjerne og centralnervesystem (neoplasi)	C70-72, C751-753, D32-33, D352-354, D42-43, D443-D445
Lymfatisk væv	C81-90, D459*, D471*, D473*, D475*
Bloddannende væv	C91-96, D46*, D474*

Note: \*Disse diagnoser blev tilføjet til publikationen i 2019 og overlevelsen for de tilhørende grupper kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.