

**Bilag 1:** Sammenligningsvolumen ved 18 måneders behandling anvendt af RADS og egne beregninger af gennemsnitlig ordineret daglig dosis (PDD) pba. heraf. Sammenligningsvolumet er for voksne i behandling, børn doseres typisk efter vægt. Den gennemsnitlige pris pr. DDD er beregnet ud fra indberettet salg til Lægemiddelstatistikregisteret i 2012 og for 1. halvår 2013. Den gennemsnitlige pris på salg fra sygehusapotek er opgjort i 'sidste indberettede indkøbspris' inkl. moms, hvorimod salg fra privat apoteker er opgjort i 'ekspeditionspris' inkl. avance, moms og evt. receptgebyr. De to priser er ikke direkte sammenlignelige.

Produkter	Reumatologi	Dermatologi	Medicinsk gastroenterologi	Gennemsnitlig PDD	WHO DDD-værdi	Gennemsnitlig pris pr. DDD 1. halvår 2013 (og 2012-tal)
Enbrel®	79 á 50 mg <i>eller</i>	91 á 50 mg <i>eller</i>	-	7,2 mg (REU)	7 mg <sup>7</sup>	376 (395) DKK (10 mg, sygehusapotek) <sup>1</sup>
	158 á 25 mg	182 á 25 mg		8,3 mg (DERM)		358 (395) DKK (25 mg, sygehusapotek)
						426 (424) DKK (25 mg, privat apotek)
						374 (373) DKK (50 mg, sygehusapotek)
Remicade®	RA/PSA: 45,927 á 100 mg	44,5 á 100 mg	38,9375 á 100 mg	8,3 mg (RA/PSA)	3,75 mg <sup>5</sup>	202 (199) DKK (100 mg, sygehusapotek)
	AS: 56,2417 á 100 mg			10,2 mg (AS)		- (226) DKK (100 mg, privat apotek)
				8,1 mg (DERM)		
				7,1 mg (GAS)		
Humira®	39,5 á 40 mg	41 á 40 mg	43,5 á 40 mg	2,9 mg (REU)	2,9 mg <sup>5</sup>	399 (409) DKK (40 mg, sygehusapotek)
				3,0 mg (DERM)		440 (445) DKK (40 mg, privat apotek)
				3,2 mg (GAS)		
Cimzia®	RA/PSA: 42,5 á 200 mg	-	-	15,5 mg (RA/PSA)	14 mg	245 (327) DKK (200 mg, sygehusapotek)

Simponi®	RA: <sup>2</sup> , PSA: <sup>3</sup>	-	-	1,64 mg (AS)	1,66 mg	326 (371) DKK (50 mg, sygehusapotek)
	AS: 18 á 50 mg					- (437) DKK (50 mg, privat apotek)
Orencia®	RA/PSA: 62,25 á 250 mg	-	-	28,4 mg (RA/PSA)	27 mg	530 (530) DKK (125 mg, sygehusapotek)
						366 (394) DKK (250 mg, sygehusapotek)
						- (429) DKK (250 mg, privat apotek)
Kineret®	RA: <sup>4</sup>	-	-	-	0,1 mg <sup>5</sup>	327 (328) DKK (100 mg, sygehusapotek)
Roactemra®	RA/PSA: 29,862 á 400 mg	-	-	21,8 mg (RA/PSA)	20 mg	294 (318) DKK (20 mg/ml, sygehusapotek)
	eller 59,724 á 200 mg					368 DKK (20 mg/ml, privat apotek)
Stelara®	-	6,1625 á 45 mg <i>plus</i>	-	0,68 mg (DERM)	0,54 mg	398 (392) DKK (45 mg, sygehusapotek)
		1,0875 á 90 mg				439 (442) DKK (45 mg, privat apotek)
						199 (196) DKK (90 mg, sygehusapotek)
						219 (221) DKK (90 mg, privat apotek)
MabThera®	RA/PSA: 12 á 500 mg	-	-	10,9 mg (RA/PSA)	(1 g) <sup>6</sup>	278 (280) DKK (100 mg, sygehusapotek) <sup>7</sup>
						277 (279) DKK (500 mg, sygehusapotek) <sup>7</sup>
Ilaris®						1.836 (1.860) DKK (150 mg, sygehus) <sup>8</sup>

RA – leddegigt, PSA – psoriasisgigt, AS - rygsøjlegigt

1: Enbrel® 10 mg er til pædiatrisk brug

2: Simponi® fravælges af RADS pga. utilstrækkelige radiografiske data om udvikling af erosioner.

3: Simponi® fravælges pga. manglende dokumentation af tilstrækkelig effekt på hudkomponenten.

4: Kineret® fravælges af RADS pga. manglende dokumentation for tilstrækkelig effekt.

5: DDD-værdien af etanercept, infliximab, anakinra og adalimumab er ifølge WHO guidelines sat ud fra behandling af leddegigt (RA).

6: MabThera® ikke har en WHO DDD-værdi, men opgøres i gram i Lægemiddelstatistikregisteret.

7: Den anførte gennemsnitlig pris pr. DDD beregnet som gennemsnitlig pris pr. PDD (10,9 mg), da Mabthera® ikke har en DDD-værdi.

8: Ilaris® WHO DDD-værdi er 2,7 mg og sat efter behandling af CAPS. Ved børnegigt er doseringen 4 mg/kg hver 4. uge, dvs. børn over 19 kg skal have mere end 1 DDD.