

RAPPORT

2024

Kræftoverlevelse i Danmark

Cancerregisteret

2008 - 2022



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	2. maj 2024
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Kræftoverlevelse i Danmark

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

Kræftoverlevelse i Danmark fra 2008 til 2022	4
1-årsoverlevelse for alle kræftformer	5
5-årsoverlevelse for alle kræftformer	6
Udviklingen i overlevelsen for 15 udvalgte kræftformer	7
1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer	8
5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer	9
Bilagstabeller	11

Kræftoverlevelse i Danmark fra 2008 til 2022

Denne rapport fokuserer på udviklingen i henholdsvis 1-års- og 5-årsoverlevelse for alle kræftformer samlet samt for 15 udvalgte kræftformer i perioden 2008-2022. Overlevelsen er beregnet som relativ overlevelse, *jf.* Tekstboks 1.

Prostatakræft og brystkræft udgør en stor del af den samlede kræftforekomst, og følgelig påvirker særligt disse to kræftformer den samlede overlevelse (for begge i positiv retning), *jf.* Tekstboks 2 side 7. Den samlede overlevelse opgøres derfor både inklusiv og eksklusiv disse to kræftformer.

Foruden nærværende rapport præsenteres 3-års- og 10-årsoverlevelse, regionale fordelinger samt dokumentation af metoder på esundhed.dk - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata: [Link til opgørelse af kræftoverlevelse 2008-2022 på eSundhed..](#)

Tekstboks 1: Relativ overlevelse

Overlevelsen måles som den aldersstandardiserede relative overlevelse henholdsvis et og fem år efter diagnose. Relativ overlevelse kan fortolkes som sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom i en given periode, hvis kræftsygdommen var eneste mulige dødsårsag. Den relative overlevelse beregnes som forholdet mellem den observerede overlevelse blandt personer med kræft og den forventede overlevelse for en køn- og aldersmæssig tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der antages ikke at have den pågældende kræftdiagnose.

Kræfttilfældene er opdelt i 3-års diagnoseperioder, som refererer til årene for diagnose. 95 procent (pct.) sikkerhedsinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).


1-årsoverlevelse for alle kræftformer

For personer diagnosticeret i 2020-2022 var den samlede 1-årsoverlevelse for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft¹ end modermærkekræft²) på 84 procent (pct.) for kvinder og 83 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1.

Ved yderligere eksklusion af prostata- og brystkræft var den samlede 1-årsoverlevelse for personer diagnosticeret i 2020-2022 på 80 pct. for kvinder og 78 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1.

I perioden fra 2008-2010 til 2020-2022 ses en stigning i 1-årsoverlevelsen efter kræft fra 77 pct. til 84 pct. for kvinder og fra 75 pct. til 83 pct. for mænd, *jf.* Figur 1 og Bilagstabel 1. Sammenlignet med perioden 2017-2019 er 1-årsoverlevelsen for perioden 2020-2022 et procentpoint højere for mænd, mens den er uændret for kvinder.

Figur 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakræft), 2008-2010 til 2020-2022



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

¹ Eksklusiv basalcelle hudkræft.


² Anden hudkræft end modermærkekræft medregnes ikke, da disse kræftformer sjældent er dødelige.

5-årsoverlevelse for alle kræftformer

I perioden 2020-2022 er den samlede 5-årsoverlevelse 70 pct. for kvinder og 67 pct. for mænd for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft), *jf.* Figur 2. I perioden fra 2008-2010 til 2020-2022 ses en stigning i 5-årsoverlevelsen efter kræft fra 62 pct. til 70 pct. for kvinder og fra 59 pct. til 67 pct. for mænd, *jf.* Figur 2 og Bilagstabel 2. Sammenlignet med perioden 2017-2019 er 5-årsoverlevelsen for perioden 2020-2022 uændret for begge køn.

Når mænd med prostatakræft og kvinder med brystkræft ikke medregnes, er den samlede 5-årsoverlevelse for personer diagnosticeret i 2020-2022 på 64 pct. for kvinder og 61 pct. for mænd. Sammenlignet med perioden 2017-2019 er 5-årsoverlevelsen steget med et procentpoint for begge køn, *jf.* Figur 2 og Bilagstabel 2.

Figur 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakræft), 2008-2010 til 2020-2022



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS)

Udviklingen i overlevelsen for 15 udvalgte kræftformer

Den stigende tendens i 1- og 5-årsoverlevelsen for kvinder og mænd siden perioden 2008-2010 ses for de fleste af de udvalgte kræftformer, *jf.* Bilagstabel 1 og Bilagstabel 2. Dog har overlevelsen for prostata-, testikel-, bryst- og modermærkekræft i hele perioden ligget forholdsvis højt.

For begge køn ses den største stigning i både 1-års- og 5-årsoverlevelsen for lungekræft. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for lungekræft steget fra 42 pct. i 2008-2010 til 62 pct. i 2020-2022, mens den for mænd i samme periode er steget fra 35 pct. til 54 pct., *jf.* Bilagstabel 1. Stigningen i 5-årsoverlevelsen for lungekræft fra 2008-2010 til 2020-2022 er for kvinder på 18 procentpoint og for mænd på 14 procentpoint, *jf.* Bilagstabel 2. Den næsthøjeste stigning i 5-årsoverlevelsen ses for tyktarmskræft med en stigning fra 59 pct. i 2008-2010 til 72 pct. i 2020-2022 for kvinder og fra 58 pct. til 70 pct. for mænd i samme periode.

Tekstboks 2: Diagnostisk aktivitet

I årene frem til 2009 blev den diagnostiske aktivitet for prostatakkræft og brystkræft øget med henblik på tidlig opsporing og diagnose. Det indebar øget brug af PSA-måling³ og udrulning af mammografi-screening til hele Danmark i 2007-2009. Disse tiltag kan være medvirkende til den forbedrede overlevelse, der er observeret i de efterfølgende år.

I foråret 2014 blev nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft implementeret, og overlevelsestallene for disse kræftsygdomme skal ses i lyset af dette.

Øget diagnostisk aktivitet kan påvirke overlevelsestallene på flere måder. Det kan føre til, at kræften opdages på et tidligere tidspunkt, og personer med kræft af den grund lever længere efter diagnosetidspunktet (lead time bias). Derudover kan man finde flere langsomt voksende kræftsvulster end tidligere, og derfor vil flere mindre aggressive kræfttilfælde med bedre prognose indgå i overlevelsesberegningerne (length time bias).

³ prostata-specifikt-antigen (PSA) målt ved blodprøve.

1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

For mænd er 1-årsoverlevelsen for lungekræft to procentpoint højere i 2020-2022 (54 pct.) sammenlignet med den foregående periode 2017-2019 (52 pct.), *jf.* Tabel 1. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for lungekræft 62 pct. i 2020-2022, hvilket ligeledes er to procentpoint højere end i 2017-2019. For mænd er 1-årsoverlevelsen for tyktarmskræft på 85 pct. i 2020-2022 sammenlignet med 87 pct. i 2017-2019. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for livmoderhalskræft og æggestokkræft to procentpoint lavere i 2020-2022 sammenlignet med 2017-2019.

Tabel 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer, 2017-2019 til 2020-2022

	Kvinder		Mænd	
	2017-2019	2020-2022	2017-2019	2020-2022
Hoved-hals*	87 (85-89)	88 (86-89)	83 (82-85)	84 (83-86)
Tyktarm	86 (85-87)	86 (85-87)	87 (86-88)	85 (84-86)
Endetarm	91 (90-92)	90 (88-91)	89 (88-91)	90 (88-91)
Lunge	60 (59-62)	62 (61-64)	52 (51-54)	54 (52-55)
Modermærke	99 (99-100)	99 (99-100)	98 (98-99)	98 (98-99)
Bryst	97 (97-98)	97 (97-97)		
Livmoderhals	91 (89-93)	89 (86-91)		
Livmoder	93 (91-94)	93 (91-94)		
Æggestok	83 (81-85)	81 (79-83)		
Prostata			98 (98-99)	98 (98-99)
Testikel			98 (94-99)	99 (95-100)
Neoplasi i urinveje	87 (86-89)	88 (87-89)	90 (90-91)	91 (90-92)
Hjerne og centralnervesystem	92 (91-93)	91 (90-92)	85 (84-86)	86 (85-88)
Lymfatisk væv*	93 (92-93)	93 (92-94)	90 (89-91)	90 (89-91)
Bloddannende væv*	82 (80-84)	82 (80-84)	84 (82-85)	84 (82-85)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

*For disse grupper blev der foretaget ændringer i de inkluderede diagnoser (Bilagstabel 3) til publikationen i 2019 og overlevelsen for grupperne kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.

5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

For kvinder er 5-årsoverlevelsen for hoved-halskræft, livmoderkræft og livmoderhalskræft to procentpoint lavere i 2020-2022 sammenlignet med 2017-2019, *jf.* Tabel 2. Derimod er 5-årsoverlevelsen for kræft i lymfatisk væv og lungekræft for kvinder to procentpoint højere i 2020-2022 sammenlignet med 2017-2019. For de øvrige kræftformer er 5-årsoverlevelsen for kvinder stort set uændret mellem de to perioder.

For mænd er 5-årsoverlevelsen for tyktarmskræft to procentpoint lavere (70 pct.) i 2020-2022 sammenlignet med 2017-2019 (72 pct.). Derimod er 5-årsoverlevelsen for kræft i hjerne- og centralnervesystem for mænd to procentpoint højere i 2020-2022 sammenlignet med 2017-2019. De øvrige kræftformer varierer højest med et procentpoint mellem de to perioder for mænd.

Tabel 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer, 2017-2019 til 2020-2022

	Kvinder		Mænd	
	2017-2019	2020-2022	2017-2019	2020-2022
Hoved-hals*	75 (72-77)	73 (70-76)	64 (62-67)	64 (61-67)
Tyktarm	72 (70-73)	72 (70-74)	72 (70-74)	70 (68-72)
Endetarm	74 (71-76)	74 (70-76)	70 (68-73)	71 (68-73)
Lunge	32 (31-34)	34 (32-36)	26 (24-27)	26 (25-28)
Modermærke	98 (97-99)	98 (97-99)	95 (94-96)	96 (94-97)
Bryst	90 (89-91)	90 (89-91)		
Livmoderhals	79 (76-82)	77 (73-80)		
Livmoder	81 (79-83)	79 (77-82)		
Æggestok	45 (42-48)	45 (42-48)		
Prostata			90 (88-91)	89 (88-90)
Testikel			95 (89-98)	94 (86-98)
Neoplasi i urinveje	76 (74-77)	76 (73-78)	78 (77-79)	79 (78-81)
Hjerne og centralnervesystem	85 (83-86)	85 (83-86)	72 (70-73)	74 (72-76)
Lymfatisk væv*	83 (82-85)	85 (83-87)	78 (76-80)	79 (77-81)
Bloddannende væv*	66 (64-69)	65 (62-68)	65 (63-67)	64 (62-67)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

*For disse grupper blev der foretaget ændringer i de inkluderede diagnoser (Bilagstabel 3) til publikationen i 2019 og overlevelsen for grupperne kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.

Publikation:	Publikationen "Kræftoverlevelse i Danmark" fra Sundhedsdatastyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratører inden for stat, regioner, kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.
Mere information:	Se mere detaljerede tal samt metodebeskrivelse på esundhed.dk - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata [https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Kraeftoverlevelse]
Kilde og beregninger:	Alle beregninger er foretaget af Kræftens Bekæmpelse for Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af Cancerregisteret og CPR.
Kontaktperson:	Sofia Charlotte Kelly, tlf. 3056 7547, schk@sundhedsdata.dk Andrea Refshøj Skaaning, tlf. 3268 8901, arsk@sundhedsdata.dk

Bilagstabeller

Bilagstabel 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer og for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd), 2008-2010 til 2020-2022.

	Kvinder					Mænd				
	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020-2022	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020-2022
Hoved-hals	82 (80-84)	82 (79-84)	87 (85-88)	87 (85-89)	88 (86-89)	78 (76-80)	79 (77-81)	84 (82-85)	83 (82-85)	84 (83-86)
Tyktarm	77 (76-79)	81 (80-83)	87 (86-88)	86 (85-87)	86 (85-87)	77 (76-78)	81 (80-82)	86 (85-87)	87 (86-88)	85 (84-86)
Endetarm	84 (82-86)	86 (84-87)	90 (89-92)	91 (90-92)	90 (88-91)	84 (82-85)	85 (84-87)	90 (88-91)	89 (88-91)	90 (88-91)
Lunge	42 (40-43)	49 (47-50)	55 (54-56)	60 (59-62)	62 (61-64)	35 (34-37)	40 (39-42)	46 (45-48)	52 (51-54)	54 (52-55)
Modermærke	98 (97-98)	99 (98-99)	99 (98-99)	99 (99-100)	99 (99-100)	96 (96-97)	97 (96-98)	99 (98-99)	98 (98-99)	98 (98-99)
Bryst	96 (96-97)	97 (96-97)	97 (97-98)	97 (97-98)	97 (97-97)					
Livmoderhals	86 (84-89)	89 (86-91)	88 (86-90)	91 (89-93)	89 (86-91)					
Livmoder	93 (91-94)	94 (93-95)	93 (92-94)	93 (91-94)	93 (91-94)					
Æggestok	75 (73-77)	78 (76-80)	80 (78-82)	83 (81-85)	81 (79-83)					
Prostata						98 (97-98)	98 (98-98)	98 (98-99)	98 (98-99)	98 (98-99)
Testikel						-	97 (93-99)	97 (93-99)	98 (94-99)	99 (95-100)
Neoplas i urinveje ¹⁾	80 (78-82)	84 (82-85)	86 (84-87)	87 (86-89)	88 (87-89)	85 (84-86)	87 (86-88)	90 (89-90)	90 (90-91)	91 (90-92)
Hjerne og centralnervesystem ¹⁾	86 (84-87)	88 (87-90)	90 (89-91)	92 (91-93)	91 (90-92)	78 (77-80)	83 (82-85)	85 (83-86)	85 (84-86)	86 (85-88)
Lymfatisk væv ¹⁾	87 (86-88)	89 (88-90)	92 (91-93)	93 (92-93)	93 (92-94)	85 (83-86)	87 (85-88)	90 (88-91)	90 (89-91)	90 (89-91)
Bloddannende væv ¹⁾	78 (76-80)	83 (81-85)	84 (82-86)	82 (80-84)	82 (80-84)	77 (75-79)	81 (79-82)	84 (82-85)	84 (82-85)	84 (82-85)
Alle kræftformer²⁾	77 (77-77)	79 (79-80)	83 (82-83)	84 (83-84)	84 (84-85)	75 (75-76)	78 (77-78)	81 (81-81)	82 (82-82)	83 (82-83)
Alle kræftformer³⁾	70 (70-71)	74 (73-74)	78 (78-79)	80 (79-80)	80 (80-81)	68 (67-68)	71 (71-72)	76 (76-76)	77 (77-78)	78 (78-79)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023 og Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen. Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 25 personer ved periodestart og minimum 5 personer i aldersgrupperne ved periodestart. Disse fremgår som "-".

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

1) Inkluderer også andet end invasiv cancer *jf.* Bilagstabel 3.

2) Alle kræftformer ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft.

3) Alle kræftformer ekskl. prostatakræft (mænd) og brystkræft (kvinder) samt anden hudkræft end modermærkekræft.

Bilagstabel 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer og for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd), 2008-2010 til 2020-2022

	Kvinder					Mænd				
	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020-2022	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020-2022
Hoved-hals	66 (63-69)	66 (63-69)	71 (68-73)	75 (72-77)	73 (70-76)	58 (55-61)	57 (54-59)	65 (63-68)	64 (62-67)	64 (61-67)
Tyktarm	59 (57-61)	65 (63-67)	73 (71-74)	72 (70-73)	72 (70-74)	58 (56-60)	63 (61-64)	72 (70-73)	72 (70-74)	70 (68-72)
Endetarm	65 (63-68)	68 (65-71)	76 (74-78)	74 (71-76)	74 (70-76)	63 (61-65)	67 (65-69)	73 (71-75)	70 (68-73)	71 (68-73)
Lunge	16 (14-17)	22 (21-23)	26 (25-27)	32 (31-34)	34 (32-36)	12 (11-13)	14 (13-15)	20 (18-21)	26 (24-27)	26 (25-28)
Modermærke	93 (92-94)	95 (94-96)	97 (95-97)	98 (97-99)	98 (97-99)	89 (87-91)	91 (90-93)	95 (93-96)	95 (94-96)	96 (94-97)
Bryst	87 (86-88)	88 (87-89)	89 (88-90)	90 (89-91)	90 (89-91)					
Livmoderhals	68 (64-71)	72 (69-75)	73 (70-76)	79 (76-82)	77 (73-80)					
Livmoder	84 (82-86)	82 (80-84)	84 (82-86)	81 (79-83)	79 (77-82)					
Æggestok	40 (38-43)	41 (39-44)	45 (42-47)	45 (42-48)	45 (42-48)					
Prostata						88 (87-89)	89 (88-90)	89 (88-90)	90 (88-91)	89 (88-90)
Testikel						-	97 (89-99)	97 (89-99)	95 (89-98)	94 (86-98)
Neoplasi i urinveje ¹⁾	65 (62-67)	69 (67-71)	72 (70-74)	76 (74-77)	76 (73-78)	71 (69-72)	73 (72-74)	77 (76-78)	78 (77-79)	79 (78-81)
Hjerne og centralnervesystem ¹⁾	74 (72-76)	79 (78-81)	82 (80-83)	85 (83-86)	85 (83-86)	62 (60-64)	68 (66-70)	71 (69-73)	72 (70-73)	74 (72-76)
Lymfatisk væv ¹⁾	74 (72-76)	78 (77-80)	83 (82-85)	83 (82-85)	85 (83-87)	69 (67-71)	71 (69-73)	76 (75-78)	78 (76-80)	79 (77-81)
Bloddannende væv ¹⁾	60 (57-63)	65 (62-68)	66 (64-69)	66 (64-69)	65 (62-68)	57 (54-59)	62 (60-65)	64 (62-66)	65 (63-67)	64 (62-67)
Alle kræftformer²⁾	62 (62-63)	64 (64-65)	68 (68-69)	70 (70-70)	70 (70-71)	59 (58-60)	62 (61-62)	66 (66-66)	67 (67-68)	67 (67-68)
Alle kræftformer³⁾	52 (52-53)	56 (56-57)	62 (61-62)	63 (63-64)	64 (63-64)	49 (48-49)	53 (52-54)	59 (58-59)	60 (60-61)	61 (60-62)

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. september 2023 og Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2023, Sundhedsdatastyrelsen. Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 25 personer ved periodestart og minimum 5 personer i aldersgrupperne ved periodestart. Disse fremgår som "-".

Note: 3-års perioderne refererer til årene for diagnose. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).

1) Inkluderer også andet end invasiv cancer jf. Bilagstabel 3.

2) Alle kræftformer ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft.

3) Alle kræftformer ekskl. prostatakræft (mænd) og brystkræft (kvinder) samt anden hudkræft end modermærkekræft.

Bilagstabel 3 ICD10 gruppering til grund for udvalgte grupper

Anvendt klassifikation	ICD-10
Hoved-hals	C00-14*, C30-32, C73
Tyktarm	C18-19
Endetarm	C20
Lunge	C33-34
Modermærke	C43
Bryst	C50
Livmoderhals	C53
Livmoder	C54-55
Æggestok	C56, C570-4
Prostata	C61
Testikel	C62
Neoplasi i urinveje	C64-68, D090-091, D095-096, D301-309, D411-419 Yderligere er D-koderne afgrænset ved morfologierne 812-813.
Hjerne og centralnervesystem (neoplasi)	C70-72, C751-753, D32-33, D352-354, D42-43, D443-D445
Lymfatisk væv	C81-90, D459*, D471*, D473*, D475*
Bloddannende væv	C91-96, D46*, D474*

Note: *Disse diagnoser blev tilføjet til publikationen i 2019 og overlevelsen for de tilhørende grupper kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.