

Nyeste fødselsdata viser svag tendens til faldende spædbarnsdødelighed i Danmark i perioden 2018-2021

Andelen af dødfødte blandt nyfødte er uændret, mens dødeligheden inden for første leveår er faldende

Andelen af dødfødte børn har i perioden fra 2018-2021 ligget mellem 0,32 og 0,39% af alle nyfødte, hvilket svarer til mellem 32 og 39 pr. 10.000 nyfødte. Hvis der i stedet ses på de absolutte tal, fremgår det, at der i 2018 var i alt 200 dødfødte børn, mens antallet i 2021 var på 250 dødfødte børn, jf. Tabel 1. Til sammenligning viser tabellen, at antallet af levendefødte børn i 2018 var på 62.025 levendefødte børn, mens antallet i 2021 var på 63.555 levendefødte børn.

Opgørelser af spædbarnsdødelighed skal således ses i relation til det samlede fødselstal og bør desuden opgøres ved frasortering af senaborter¹. Senaborter taget i betragtning, ses en reduktion på i alt 75-95 i antallet af nyfødte, som enten er dødfødte eller dør inden for første leveår (Tabel 1).

Tabel 1 viser en svagt faldende dødelighed blandt levendefødte inden for deres første leveår. Antallet, som dør inden for første leveuge, er faldet fra 125 i 2018 til 90 i 2021, mens antallet, som dør mellem dag 28 og 365 er faldet fra 50 i 2018 til foreløbigt 35 i 2021. For 2021 er der tale om foreløbige tal for de levendefødte død dag 28-365, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår.

Tabel 1 Spædbarnsdødelighed, 2018-2021.

| Spædbarnsdødelighed | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Dødfødte</i> | | | | |
| Dødfødt | 165 | 180 | 175 | 205 |
| Senabort ¹ | 40 | 45 | 55 | 45 |
| Total | 200 | 225 | 225 | 250 |
| <i>Levendefødte</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 61.800 | 61.365 | 61.080 | 36.365* |
| Levendefødt død dag 0-6 | 125 | 80 | 100 | 90 |

¹ Givet den danske lovgivning anses et dødfødt barn født før uge 22+0 for en abort. I tilfælde, hvor der i graviditeten forud for fødslen laves et abortindgreb, f.eks. som følge af mistanke om misdannelser hos fosteret, og dette fører til en fødsel af enten et dødfødt barn, som vejer maks. 1000 g, eller et levendefødt barn, som dør senest dagen efter fødslen og vejer maks. 1000 g, er disse i opgørelser af spædbarnsdødelighed kategoriseret som 'senabort'. Disse ønskes frasorteret, da graviditeten er afbrudt, samt for at skabe sammenlignelighed til internationale opgørelser af spædbarnsdødelighed, hvor disse fødsler ikke indgår.

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Levendefødt død dag 7-27 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Levendefødt død dag 28-365 | 50 | 35 | 25 | 35* |
| Senabort ¹ | 40 | 45 | 40 | 45 |
| Total | 62.025 | 61.540 | 61.260 | 63.555 |

Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr. 14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Antallet af nyfødte og fødsler er afrundet til nærmeste 5.

¹ Senabort er defineret ved dødfødte eller levendefødte, som enten dør samme dag som fødslen eller senest dagen efter og vejer maks. 1000 g, hvor der forud for fødslen er gennemført et abortindgreb.

* Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår.

Statistikken samt dokumentation kan ses på [Nyfødte og fødsler \(1997-\)](https://esundhed.dk) (esundhed.dk).

Overlevelse efter første leveår blandt for tidligt levendefødte er steget i perioden 2018-2021

Tabel 2 viser, at andelen af ekstremt for tidligt fødte blandt levendefødte, som overlevede deres første leveår, i 2018 var 60,5 %, mens andelen i 2021 var 67,4 %. Andelen af overlevende meget for tidligt levendefødte efter et år var ligeledes steget fra 95,1 % i 2018 til 98,6 % i 2021. For levendefødte, som var moderat for tidligt fødte, fødte til termin eller ved overbåren graviditet, var 1-års overlevelse svagt stigende eller uændret i samme periode fra 2018-2021 (Tabel 2). Se evt. Bilagstabel 1 for tilgrundliggende data for opgørelser i Tabel 2.

Tabel 2 Levendefødtes 1-års overlevelse fordelt på gestationsalder² (%), 2018-2021.

| Gestationsalder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| <28: Ekstremt for tidligt født | 60,5 | 71,8 | 62,2 | 67,4 |
| 28-31: Meget for tidligt født | 95,1 | 96,1 | 95,9 | 98,6 |
| 32-36: Moderat for tidligt født | 99,0 | 99,7 | 99,5 | 99,6 |
| 37-41: Født til termin | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 42+: Overbåren graviditet | 99,6 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| Ukendt | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr. 14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: * Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår.

Statistikken samt dokumentation kan ses på [Nyfødte og fødsler \(1997-\)](https://esundhed.dk) (esundhed.dk).

² Et fosters alder målt fra graviditetens begyndelse, typisk opgjort i uger og dage (uu + dd).

Bilag

Bilagstabel 1 Levendefødtes spædbarnsdødelighed fordelt på gestationsalder, 2018-2021.

| Spædbarnsdødelighed | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <i><28: Ekstremt for tidligt født</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 115 | 140 | 115 | 145 |
| Levendefødt død dag 0-6 | 65 | 50 | 60 | 60 |
| Levendefødt død dag 7-27 | <5 | <5 | 10 | 10 |
| Levendefødt død dag 28-365 | 10 | <5 | <5 | <5 |
| Total | 190 | 195 | 185 | 215 |
| <i>28-31: Meget for tidligt født</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 385 | 365 | 355 | 350 |
| Levendefødt død dag 0-6 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Levendefødt død dag 7-27 | <5 | 5 | <5 | <5 |
| Levendefødt død dag 28-365 | <5 | <5 | <5 | - |
| Total | 405 | 380 | 370 | 355 |
| <i>32-36: Moderat for tidligt født</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 3.095 | 3.030 | 3.065 | 3.345 |
| Levendefødt død dag 0-6 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Levendefødt død dag 7-27 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Levendefødt død dag 28-365 | 10 | <5 | 5 | <5 |
| Total | 3.125 | 3.040 | 3.080 | 3.360 |
| <i>37-41: Født til termin</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 56.360 | 56.385 | 56.210 | 58.200 |
| Levendefødt død dag 0-6 | 15 | 15 | 25 | 15 |
| Levendefødt død dag 7-27 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Levendefødt død dag 28-365 | 25 | 25 | 15 | 25 |
| Total | 56.410 | 56.430 | 56.255 | 58.520 |
| <i>42+: Overbåren graviditet</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 1.370 | 1.435 | 1.320 | 1.325 |
| Levendefødt død dag 0-6 | <5 | - | <5 | - |
| Total | 1.375 | 1.435 | 1.325 | 1.325 |
| <i>Ukendt</i> | | | | |
| Levende efter første leveår | 470 | 15 | 10 | 5 |
| Levendefødt død dag 0-6 | 15 | - | - | - |
| Levendefødt død dag 28-365 | <5 | - | - | - |
| Total | 485 | 15 | 10 | 5 |

Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr.14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Data er afgrænset til levendefødte. Dødfødte samt senaborter er ekskluderet fra tabellen.
Antallet af levendefødte er afrundet til nærmeste 5.

* Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår.

Statistikken samt dokumentation kan ses på [Nyfødte og fødsler \(1997-\) \(esundhed.dk\)](#).